

关于您的药物

医生为您开了艾达乐乳膏，它含有一种被称为咪喹莫特（imiquimod）的有效成份。


这种药物有何效用？

咪喹莫特针对免疫系统，专门用来治疗成人的外生殖器疣和肛周疣/尖锐湿疣，或光化性角化病/日光性角化病。


也可以遵循医生的决定，使用此药膏来治疗其他皮肤病，例如儿童的传染性软疣。

如何使用这种药物？

- 每周涂抹3-5次，睡前涂抹并保留在皮肤上6-10小时。
- 在涂抹前，用温和的香皂和清水将双手和患处清洗干净并擦干，然后挤一些乳膏在指尖上。



- 在患处涂抹一层薄薄的乳膏，轻揉皮肤，直至乳膏被完全吸收。不要用过量的乳膏覆盖患处。



- 涂抹乳膏后，用温和的香皂和清水将双手洗净。



- 让乳膏保留在患处6-10小时，在此期间不得洗澡。



- 6-10小时后，用温和的香皂和清水将涂抹乳膏的部位清洗干净。
- 按照医生所规定的疗程涂抹几次后，皮肤的患处会在痊愈后收缩或干枯。



忘了涂药，怎么办？

当您记起时，赶快涂抹。但如果已接近下一次涂抹的时间，那就等到下一次用药的时间再涂抹。

这种药物会引起什么副作用？

这种药膏所引起的某些副作用并非异常，但如果副作用持续不退或恶化，请咨询您的医生。

- 患处的皮肤出现发红、肿胀及脱皮等现象均属正常，这是您的免疫系统与异常细胞进行对抗的迹象。即使没有出现这些症状，药物仍然有效。
- 如果出现严重的皮肤反应，应立即使用温和的香皂和清水将乳膏清洗掉。停用 3-4 天后，再继续涂抹。

咪喹莫特乳膏 Imiquimod Cream

有哪些应注意的事项？

- 咪喹莫特乳膏仅供外用，应避免接触到眼睛。
- 如果您已怀孕或正处于母乳喂养期，请立即向您的医生咨询使用这种药膏的风险和益处。
- 建议患处在完成任何前期药物或外科治疗痊愈后，才使用咪喹莫特乳膏。
- 不应包扎、遮盖或包裹治疗部位使其密不透风。

对于使用这种药膏来治疗外生殖器疣和肛周疣/尖锐湿疣的患者：

- 当皮肤上涂有药膏时，应避免性接触。
- 咪喹莫特乳膏可能会使避孕套或阴道避孕膜变薄，因此不建议同时使用。
- 如果出现严重紧绷、肿胀或皮肤开裂等现象，应立即停用并咨询您的医生。

如何存放此药物？

- 放在阴凉干爽的地方，避免阳光直接晒到；
- 放在孩童触摸不到的地方。

如有疑问，请咨询您的医生或药剂师：
National Skin Centre (全国皮肤中心)
1 Mandalay Road, Singapore 308205.
电话: 63508454

2010年3月



全国皮肤中心